

Medasept^{színezetlen}

100 ml
250 ml
500 ml
1 liter

Bőrfertőtlenítőszer, sebészi bemosakodó
és higiénés kézfertőtlenítőszer



Általános leírás

A MEDASEPT SZÍNEZETLEN alkoholos hatóanyagokat tartalmazó, széles antimikrobiális spektrummal rendelkező bőrfertőtlenítő-, sebészi bemosakodó és kézfertőtlenítőszer. A MEDASEPT SZÍNEZETLEN színtelen, jellegzetes illatú készítmény.

Alkalmazási terület

Egészségügyi intézményekben (kórházakban, rendelőintézetekben, stb.), injekciók, punkciók, vérvételi előtti fertőtlenítésre, műtéti bőrterület fertőtlenítésére, higiénés kézfertőtlenítésre, sebészi kézfertőtlenítésre és sebészi bemosakodásra használható.

Tulajdonságok

- Nagyon gyors fertőtlenítést tesz lehetővé
- Aldehydmentes

Összetétel

Etanol (83,5 %); bienil-2-ol (0,15%); Benzil-alkohol (0,8-1,2 %); Tejsav, Víz

Hatásspektrum

- Baktericid (MRSA is)
- Fungicid
- Virucid (Hepatitis B és HIV inaktiváló)
- Tuberkulocid

Alkalmazási koncentráció és behatási idő

A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni

Bőrfertőtlenítés esetén

0,5 perc behatási idő

Műtéti beavatkozás előtt a bőrfertőtlenítés ideje min. 3 perc

(Faggyúmirigyekben gazdag bőrterület fertőtlenítése: 10 perc behatási idő)

Sebészi bemosakodás esetén

5 x 1 perc behatási idő

Higiénés kézfertőtlenítés esetén

0,5 perc behatási idő

(Virucid hatás eléréséhez)

min. 1 perc behatási idő

(Tuberkulocid hatás eléréséhez)

min. 1 perc behatási idő

A fertőtlenítés végrehajtása

Bőrfertőtlenítés

Injekciók, punkciók előtt a bőrfelületet 0,5 perc behatási ideig kezeljük a készítménnyel.

Műtéti beavatkozás előtt a műtéti terület környékét kezeljük a készítménnyel, majd hagyjuk a felületre rászáradni. A beavatkozás csak ezután, minimálisan 3 perc elteltével kezdhető.

színezetlen
Medasept

Sebészi bemosakodás

Az adagolóból 5 ml készítményt juttatunk a tenyérbe, melyet 1 percig alaposan eldörzsölünk a kézen és az alkarokon, majd a műveletet még négyszer megismételjük. A sebészi bemosakodáshoz szükséges fertőtlenítőszer mennyisége: 5 x 5 ml = 25 ml. A sebészi bemosakodás ideje: 5 x 1 perc = 5 perc.

Higiénés kézfertőtlenítés

Az adagolóból 5 ml készítményt juttatunk a tenyérbe, amelyet 30 másodpercig alaposan eldörzsölünk a kéz bőrén. A HBV inaktiváló és tuberkulocid hatás eléréséhez minimálisan 1 perc behatási időre van szükség.

Figyelmeztetés

- Más tisztító-, és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!

Tájékoztató:

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Tárolás, eltarthatóság

Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, jól szellőző helyiségben, közvetlen napfénytől védve, gyújtóforrástól és nyílt lángtól távol tartandó, max. 30 °C, oxidálószerektől elkülönítve, gyártástól számított 3 évig eltartható.

Szállítási besorolás: UN 1993 RID/ADR 3 II.

Kiszerezés

- 100 ml (polietilén flakon szórófejjel)
- 250 ml (polietilén flakon szórófejjel)
- 500 ml (polietilén flakon)
- 1 liter (polietilén flakon, 10x1 gyűjtőzve)

Engedélyszám: JKF/10884-4/2016.

A készítmények alapanyagait szigorúan ellenőrzött forrásokból szerezzük be. A teljes gyártási folyamat során érvényes tanúsítással rendelkező GMP és ISO 9001 minőségbiztosítási rendszert működtetünk.